

Classification TNM du mélanome : AJCC 8^{ème} édition

Tumeur primitive (T)

T	Epaisseur (breslow en mm)	Ulcération
T0	Mélanomes sans évidence de tumeur primitive (mélanome entièrement régressif ou primitif inconnu)	
Tis	0/in situ/intra-épidermique	NA
T1	≤ 1,0 mm	Inconnu
T1a	< 0,8 mm	non
T1b	< 0,8 mm 0,8 à 1,0 mm	oui oui ou non
T2	> 1,0 à 2,0 mm	Inconnu
T2a		non
T2b		oui
T3	> 2,0 à 4,0 mm	Inconnu
T3a		non
T3b		oui
T4	> 4,0 mm	Inconnu
T4a		non
T4b		oui

Ganglions lymphatiques régionaux (N) et/ou métastases cutanées en transit (satellites)

N	Nombre de ganglions métastatiques envahis	Micrométastase (non palpé) Macrométastase (palpé)	Métastases cutanées en transit
N0	Aucun		Non
N1a	1	Micro	Non
N1b	1	Macro	Non
N1c	Aucun		Oui
N2a	2 ou 3	Micro	Non
N2b	2 ou 3	Macro	Non
N2c	1	Micro/Macro	Oui
N3a	4 ou +	Micro	Non
N3b	4 ou + ou conglomérat d'adénopathie	au moins 1 Macro	Non
N3c	2 ou + et/ou conglomérat d'adénopathie	Micro ou Macro	Oui

Métastases à distance (M)

M	Site anatomique
M0	Aucune métastase à distance
M1	Métastases à distance :
M1a	Cutanées / ganglionnaires / tissus mous (par ex muscles)
M1b	Pulmonaires
M1c	Autres localisations hors Système Nerveux Central
M1d	Localisations Système Nerveux Central

Stades selon AJCC 8e edition (pTNM)

Stades	T	Breslow	N	M		
0		Tis				
IA	T1a	< 0,8 mm - non ulcéré	N0	M0		
	T1b	< 0,8 mm - ulcéré 0,8 à 1 mm - non ulcéré				
IB	T2a	1 à 2 mm - non ulcéré				
IIA	T2b	1 à 2 mm - ulcéré				
	T3a	2 à 4 mm - non ulcéré				
IIB	T3b	2 à 4 mm - ulcéré				
	T4a	> 4 mm - non ulcéré				
IIC	T4b	> 4 mm - ulcéré				
IIIA	T1 ou T2a				N1a N2a	M0
IIIB	T0				N1b/c	
	T1 ou T2a		N1b/c N2b			
	T2b ou T3a		N1a/b/c N2a/b			
IIIC	T0		N2b/c N3b/c			
	T1 ou T2 ou T3a		N2c N3			
	T3b ou T4a		Tout N ≥ N1			
	T4b		N1 N2			
IIID	T4b		N3			
IV M1a,b,c ,d	Tout T		Tout N	M1		